

## 甚麼是低血糖？

通常血糖濃度低於 60mg/dl 時，會產生一些低血糖症狀；但是有些患者的血糖由高濃度急速下降時，雖然血糖仍未過低，也可能產生類似低血糖的症狀。

## 什麼情況會引起低血糖？

1. 胰島素或磺醯尿類口服降血糖藥使用過量。
2. 服藥後未進食或吃得太少，或進食時間配合不當。
3. 運動過度激烈，卻未能補充食物。

## 低血糖發生時，會有什麼症狀？

1. 初期可能會有  
頭暈、無力  
易怒、心跳加快  
飢餓感、發抖、發冷  
冒冷汗  
肢體痙攣
2. 若不立刻服用含有糖的食品（如糖果、果汁等）甚至會進行至意識不清、抽筋、昏迷。

## 如何預防低血糖？

1. 注射胰島素和口服降血糖藥時劑量要準確，且於使用後按時進食。
2. 從事額外的運動之前，須吃些點心。若從事劇烈的運動，每半小時吃含 15 公克糖的食物，例如：半片土司（25 公克）或一份水果。
3. 外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等，以備不時之需。
4. 隨身攜帶糖尿病護照，並記載聯絡辦法（醫院、家人等電話），萬一低血糖昏迷時，可爭取急救時間。

## 發生低血糖時，該怎麼辦？

1. 若病人意識清楚，應立即進食含 10~15 公克吸收之糖份的食品，例如：含糖飲料（120~150cc）或 3~4 顆方糖或一湯匙蜂蜜。10~15 分鐘後若症狀尚未解除，可再吃一次，若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫院。

如症狀改善，但離下一餐還有一小時以上，則宜酌量喝牛奶或吃些土司或餅乾等。

2. 如果病人不合作或昏迷，家屬可選擇下列方法處理：
  - 將病人頭部側放，把巧克力軟膏或一湯匙的蜂蜜或糖漿擠入或灌入病人牙縫中，並按摩臉頰，以利吸收。每十分鐘一次，並立刻送醫治療。
  - 肌肉或皮下注射升糖素，兒童約 0.5 毫克、成人約 1 毫克；或靜脈注射葡萄糖，並立即送醫。

## 血糖過低昏迷時旁人如何協助緊急處理？

1. 協助將頭部轉向側邊，給予病患含糖或糖水。
2. 勿再施打胰島素
3. 維持呼吸道通暢
4. 協助叫 119 救護車
5. 繼續觀察病患

糖尿病衛教系列(6)

低血糖發生時  
該怎麼辦？



糖尿病衛教小組  
諮詢專線：(03) 3613141 轉 2118  
106.02 828945 B4-183

沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人  
聖保祿醫院