

一、什麼是麻醉：

由於您的病情需要，必須接受手術治療，而麻醉是使用藥物將您的痛覺或知覺暫時消失，目的是為了免除您手術時的痛苦和恐懼。

二、麻醉前訪視：

為了降低麻醉的潛在風險，請務必告知麻醉醫師您的過去病史、用藥史、過敏史等，目的是要了解您的身體狀況，以便安排最適合的麻醉方式，並作好麻醉計畫。



三、麻醉前之準備：

手術前請確認同意書是否填寫完成，手術當天希望有成年家屬陪伴，便於術中醫師能與家屬解釋說明。**請勿化妝、卸除指甲油及所有可移除之物品**（如活動假牙、隱形眼鏡、飾品）。

護理師會告知您從何時開始禁食，包含任何食物及開水；高血壓及心臟病患者請依醫師醫囑停用藥物。

門診手術者，請有行為能力之親友陪伴，病人不可開車或騎車離院。

四、為何手術前要禁食：

麻醉前的禁食，是為了讓胃有足夠的時間將食物消化，避免麻醉時發生嘔吐，嘔吐物會阻塞氣管或吸入肺內，危及您的生命。

五、靜脈注射全身麻醉：

靜脈注射麻醉也是全身麻醉的一種。此種麻醉方式較適合門診手術的成年人，經由靜脈注射鎮靜、安眠、止痛的藥物，使手術醫師可進行手術。

六、麻醉過程：

手術當天，手術室之護理人員會陪您進入手術室房間，接著會由麻醉護理人員為您做麻醉前準備，如在手臂上打上點滴、量血壓，在胸前貼好心電圖等。

七、靜脈注射麻醉如何進行：

麻醉醫師會從點滴中注射藥物，讓您完全失去知覺。手術過程中您完全不會疼痛，直至手術結束。



八、麻醉後注意事項：

靜脈注射麻醉醒來後，可能會有全身無力、頭暈、嘔吐、口乾、咳嗽、痰多等症狀，是因為受麻醉藥物影響的緣故。

麻醉後，為了您的安全，需在恢復室停留約一小時左右，以便觀察您的呼吸、心跳、血壓、血氧濃度，等一切穩定後，才能返家休息。因靜脈注射麻醉後，其記憶、判斷力及動作技巧的配合能力短暫受到影響，麻醉當天應避免開車、騎車、從事危險動作，或做重大決策。



九、麻醉問與答：

Q：麻醉恢復之後多久可以開始吃東西？

A：麻醉恢復後，可能會有全身無力、頭暈、嘔吐等症狀，這些症狀都是暫時的，需要時間慢慢恢復，因為需預防嘔吐情況發生，請於離開恢復室 2 小時之後，且無頭暈噁心感等症狀，可先飲用白開水約 100~200ml 觀察無不適後，方可進食。

麻醉科印製

諮詢專線：(03) 3613141 轉 3809
106.02 版 825076 B11630

麻醉科衛教系列 (3)

靜脈注射麻醉



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院