

一、什麼是靜脈注射全身麻醉：

靜脈注射麻醉也是全身麻醉的一種，適合門診手術與較短時間的手術或檢查(如大腸鏡檢、子宮搔刮術…等)，是從點滴注射鎮靜、安眠、止痛等藥物，讓您完全失去知覺，免除您的痛苦和恐懼。

二、麻醉前訪視：

為了降低麻醉風險，麻醉醫師，會詢問您的病史及服藥、過敏等狀況，以安排最適合的麻醉方式，並作好麻醉計畫。有高血壓及心臟病者請依醫師醫囑停用藥物。若您有任何特殊的病史，請提前告知，讓麻醉醫師特別注意並及早作處置。



三、麻醉前的準備：

手術當天希望有成年家屬陪伴，便於術中醫師能與家屬解釋說明。請勿化妝、卸除指甲油及所有可移除之物品(如活動假牙、隱形眼鏡、飾品、水晶指甲等)。

護理師會告知您從何時開始禁食，包含任何食物及開水。

門診手術者，請有行為能力之親友陪伴，病人不可開車或騎車離院。

四、如何進行靜脈注射全身麻醉：

麻醉護理師會先建立一條靜脈點滴，再經由點滴管路注射鎮靜、安眠、止痛等藥物，讓您失去知覺；過程中病人的呼吸肌並無被麻醉，仍可維持自主呼吸，所以只需使用氧氣面罩來輔助您的呼吸。

此種靜脈注射全身麻醉，手術麻醉後不會產生咽喉不適，麻醉恢復期也較短。



麻醉科衛教系列 (3)

靜脈注射 全身麻醉



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院

五、靜脈注射全身麻醉注意事項：

因靜脈注射全身麻醉後，其記憶、判斷力及動作技巧的配合能力短暫受到影響，**麻醉當天請勿自行騎車、開車、從事危險動作**，或做重大決策。門診手術麻醉的病人，當天需有一位成人陪同，返家時才能確保您的安全。

靜脈注射全身麻醉醒來後，可能暫時會有全身無力、頭暈、嘔吐、口乾、咳嗽、痰多等症狀，是因為麻醉藥物影響的緣故。

麻醉後，為了您的安全，需在恢復室觀察生命徵象：呼吸、心跳、血壓、血氧濃度約一小時左右，待一切穩定後，才能返家休息。



六、麻醉問與答：

Q：麻醉恢復之後多久可以開始吃東西？

A：麻醉恢復後，可能暫時會有全身無力、頭暈、嘔吐等症狀，需要時間慢慢恢復，因為需預防嘔吐情況發生，請於離開恢復室 2 小時之後，且無頭暈噁心感等症狀，可先飲用白開水，若無不適，方可進食。



聖保祿醫院衛教單張網頁 QR Code

麻醉科印製

諮詢專線：(03) 3613141 轉 3809
109.03 版 825076 B11630