

## 一、什麼情況要放胸管

通常在接受心肺手術後，如行肺葉切除、開心手術，或因外傷及感染造成氣胸、膿胸、血胸。

## 二、放置之目的？

引流肋膜腔內多餘的氣體、液體，以恢復負壓狀態並促進肺臟擴張。

## 三、放置注意事項？

1. 臥床或翻身時，可採坐臥或半坐臥式，以利引流且勿壓迫胸管及引流管。
2. 避免引流管懸垂床面下。
3. 在不牽扯胸管範圍內，可以自由活動，但必須保持胸瓶低於胸部。
4. 多做深呼吸咳嗽運動，以幫助肺擴張。
5. 當有下列情況發生時，應立即通知醫護人員：
  - \* 呼吸困難或突發的胸部劇痛。
  - \* 引流量增加或顏色由原淡黃色轉為血色。
  - \* 覆蓋傷口的紗布有滲液或滲液量增加。

- \* 引流瓶中出现持續性氣泡。
- \* 在胸瓶打破或接管鬆脫時，除了通知醫護人員應同時反折胸管或引流管。

## 四、傷口疼痛怎麼辦？

可配合使用止痛注射劑來減輕疼痛，以維持順暢呼吸及有效咳嗽，以促進恢復。出院後這種麻和刺痛感，將藉由局部藥物塗抹或口服藥物做疼痛控制，通常疼痛會持續數週或數月才有所改善。假使疼痛嚴重到影響作息、睡眠時可與醫師討論疼痛控制解決方法。


## 五、拔除胸管時機？

1. 引流量一天少於 50cc。
2. 氣泡消失。
3. 胸部 X 光片中可見肺臟完全擴張。

## 六、拔管後注意什麼？

1. 拔管時請先深呼吸數次，吸氣後屏住呼吸，保持胸部不動，以利拔除胸管。
2. 傷口請保持乾淨，每日需執行換藥消毒，若有傷口異常發紅、滲液，

請主動和護理人員或醫師聯繫、或立即返回門診就醫。



護理部印製

諮詢專線:03-3613141 轉  
3581.3582 (5A 病房)  
3583.3584 (5B 病房)  
7585.7586 (5C 病房)  
109.07 版 822292 B42650

聖保祿醫院