

Moderna COVID-19 疫苗 孕婦接種須知



台灣婦產科醫學會 2021/06/22(初版)

禁忌症

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史

發燒或急性中重度疾病

18歲以下

常見副作用及頻率

注射部位疼痛、腫脹	92.0%
疲倦	70.0%
頭痛	64.7%
肌肉痛	61.5%
關節痛	46.4%
畏寒	45.4%
發燒($\geq 38^{\circ}\text{C}$)	15.5%

注意事項:

- 懷孕時感染COVID-19易有併發症，並致重症、甚至死亡。目前雖未有孕婦施打疫苗的長期安全性報告，但基於對已施打疫苗孕婦的研究，目前多認為利大於弊，因此建議施打。
- 對於哺乳中婦女也建議施打疫苗，不需停止或延後哺乳。
- 未預期之嚴重過敏反應很罕見，但有致命可能，故疫苗注射後應觀察30分鐘再離開。
- 流產、畸胎比率在不論有無注射疫苗的孕婦並無增加。決定注射前，尤其12周內，可以諮詢您的醫師。
- 疫苗注射後，可能會有發燒、畏寒。如體溫超過 38°C 可考慮使用藥物退燒，但目前不建議常規於注射前使用退燒藥。
- 注射後請注意有無異常，如有持續嚴重不適，如發燒超過48小時、劇烈的疼痛、噁心、嘔吐，視力改變、呼吸困難、下肢腫脹、皮膚紫斑、同時建議適度補充水分及注意胎動，如有異常，應儘速就醫。
- 第二劑通常為四周後。
- 如有疑問可與醫師討論後，再決定施打與否。

其他可能之反應及頻率

極常見	($> 1/10$)	淋巴結腫大、噁心、嘔吐
常見	($\geq 1/100 \sim < 1/10$)	接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅
不常見	($\geq 1/1,000 \sim < 1/100$)	接種部位搔癢
罕見	($< 1/1,000$)	顏面神經麻痺、臉部腫脹
極罕見	($< 1/10,000$)	未預期之嚴重過敏反應 (呼吸困難、臉部咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩、虛弱) 心肌炎 (年輕男性多、大多可治癒)、死亡 (約十萬分之一、未發現與疫苗相關)



CDC
TAIWAN V WATCH
疫苗接種健康回報