

## 麻醉科衛教系列(一)-插管全身麻醉

### 插管全身麻醉過程：

醫師從「**點滴**」注射麻醉藥物讓您睡著，暫時失去知覺及痛覺，等肌肉鬆弛後再將呼吸管經過聲帶放入氣管內，手術過程中由氣體麻醉藥物及呼吸器維持麻醉及呼吸。

手術結束後會將氣體麻醉藥物關閉，逐漸讓您醒過來，並注射肌肉鬆弛劑的解藥，使您恢復呼吸力量，必須確保呼吸力量足夠後才能將氣管內管移除。

### 圖示說明：

- \* 手術前會先給您氧氣面罩進行深呼吸，使肺內充滿氧氣。
- \* 手術後甦醒前也會給予您氧氣面罩，當您感覺面罩在臉上時請勿緊張，記得深呼吸即可。



### 麻醉後恢復：

麻醉後需在恢復室觀察生命徵象(呼吸、心跳、血壓、血氧濃度)，約1小時，待生命徵象穩定後，才能返回病房或回家。

### 全身麻醉的副作用：

可能有全身無力、頭暈、嘔吐等症狀，主要是麻醉藥物的影響；喉嚨疼痛、口乾、咳嗽、痰多等症狀，多半是喉嚨放置呼吸管所引起的，一般會在2~5天內消失。

### 全身麻醉插管 Q&A

#### Q1. 插管時是否會痛？

A：放入呼吸管前您已完全失去知覺後，手術過程中也不會讓您甦醒或感到疼痛，一直到手術結束。

#### Q2. 手術後為何會喉嚨痛或聲音沙啞？

A：插呼吸管會引起咽喉及氣管黏膜組織水腫，這種情形大多在拔管後持續數小時，多喝溫開水即可改善。

少數病人可能出現黏膜損傷及潰瘍情形而感到疼痛，此疼痛會長達數天，若喉嚨感到非常不適可告知醫師，經評估後會開立藥物治療。

麻醉科諮詢專線：(03) 3613141

轉 27371、27381、27382

麻醉科製 115.04

