

麻醉科衛教系列(三)-靜脈注射全身麻醉

靜脈注射全身麻醉：

靜脈注射麻醉也是全身麻醉的一種，適合門診手術與較短時間的手術或檢查(如大腸鏡檢、子宮搔刮術、人工血管放置手術…等)，是從點滴注射鎮靜、安眠、止痛等藥物使其睡著後便開始手術。

如何進行靜脈注射全身麻醉：

先於身上打一條點滴，再由點滴方式給予麻醉藥物；過程中使用氧氣面罩來輔助您的呼吸並給予氧氣，故麻醉後不會產生咽喉不適，麻醉甦醒也較為快速。

麻醉後恢復：

靜脈注射全身麻醉醒來後，因麻醉藥物作用可能會有暫時的全身無力、頭暈、嘔吐、口乾、咳嗽、痰多等症狀。所以麻醉後為了您的安全，需在恢復室觀察生命徵象(呼吸、心跳、血壓、血氧濃度)約 1 小時，待生命徵象穩定後，才能返家休息。

麻醉前注意事項！！！！

1. 門診手術需要禁食 8 小時，雙手雙腳皆**不可塗抹指甲油、光療指甲**等，務必提前卸除，因為會影響麻醉中血氧偵測之準確度，這是會**危害到您的生命安全**。
2. 門診手術者，必須要有**成年且有行為能力之親友**陪伴離院。
3. 靜脈注射全身麻醉後，其記憶、判斷力及動作技巧的配合能力短暫受到影響，麻醉當天**請勿自行騎車、開車、從事危險動作，或做重大決策**。

