

猛健樂注射筆 使用方法

雙手洗淨再開始以下步驟！

1 打開筆蓋

確認注射液有無變色、混濁或有顆粒，若有，則不可使用！

2 以酒精棉片消毒注射筆橡皮膜

3 撕下針頭保護膜並旋入注射筆

注意：筆直且緊密的旋入！

4 取下針頭外蓋

5 取下針頭內蓋並丟棄

6 設定排空劑量排空

針頭頂端應有藥液出現。若無，最多可重複2次直到出現，超過2次則需更換針頭再嘗試

7 設定您需施打之劑量

劑量視窗顯示1等同於完整0.6ml(10mg)劑量
轉15格=2.5mg, 轉30格=5mg

8 以酒精棉片消毒欲施打之部位

由內往外消毒，待酒精乾後再注射。

9 插入皮膚並按壓按鈕到底

針頭與皮膚成90度垂直注射

10 停留10秒後再拔出注射筆


按鈕持續按著直到拔出注射筆

11 蓋回針頭外蓋取下針頭並丟棄


用過的針頭集中在不易被穿刺的容器，並用蓋子栓緊，帶回醫院回收。

此為簡易版衛教單張，若需更詳細介紹請參考藥品仿單

6




6




猛健樂
mol

7



推動

10



沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人
聖保祿醫院
SAINT PAUL'S HOSPITAL